

# AGROPROTEKT DOO

Nikole Pašića 9, 25000 Sombor

vajgandd@sbb.rs

tel: 063-326772

fax: 025-444905

Rod i vrsta	Trenutno stanje 07. do 10. jula	Upozorenje za period od 10 do 20. jula
<i>Agrotis segetum</i>	Hvataju se pojedinačni primerci, ali je brojnost leptira počela da raste.	Očekuje se dalje povećanje brojnosti leptira.
<i>Agrotis exclamationis</i>	Počeo je ulov pojedinačnih leptira.	Očekuje se hvatanje pojedinačnih leptira.
<i>Agrotis ipsilon</i>	Hvataju se pojedinačni primerci.	Pojava pojedinačnih leptira.
<i>Lacanobia oleracea</i>	Broj leptira je nešto veća, ali je i dalje ispod praga štetnosti.	Očekuje se povećanje brojnosti leptira.
<i>Mamestra brassicae</i>	02. jula je počela da leti druga generacija. Brojnost leptira je porasla. Za par dana će biti jasno da li je u pitanju i značajno povećanje brojnosti.	Početak sledeće nedelje treba obratiti pažnju na kupusnjače. U sledećem izveštaju će biti jasnije da li treba nešto i raditi u polju.
<i>Autographa gamma</i>	Hvataju se pojedinačni primerci.	Očekuje se porast brojnosti leptira.
<i>Helicoverpa armigera</i>	U poslednja dva dana je brojnost na klopki jako porasla!	Brojnost leptira na klopki je tolika da će gusenice dostići kritičan broj na većini povrtarskih useva koji su u navodnjavanju (paprika, boranija, paradajz), a verovatno i na kukuruzu šećercu koji je u svilanju, te semenskom kukuruzu i duvanu koji su u dobroj kondiciji. Masovnija piljenja ovog naleta pamukove sovce se očekuju na liniji Srem, Pančevo, Bela Crkva, u periodu od 12 do 15 jula. Na liniji Bačka Palanka, Novi Sad, Zrenjanin u periodu 14 do 17 jula. Na liniji Odžaka, Vrbasa i Bečeja u periodu 16 do 19 jula. Na liniji Sombor, Bačka Topola, Senta, Kikinda u periodu 17 do 19 jula. Na liniji Subotica, Horgoš 18 do 22. jula. Na početku ovih perioda useve treba zaštititi sa preparatima Match ili Rimon. Na sredini ovih perioda treba vršiti zaštitu useva preparatom Avaunt, a dva do tri dana posle ovih perioda sa preparatima Thionex,

		<p>Lannate i piretroidima. Verovatno na većini lokaliteta gusenice će biti brojne i suzbijanje će biti isplativo!</p> <p>Jaja treba tražiti na plodovima paprike i paradajza te u blizini klipa kukuruza.</p> <p>Voditi računa o karenji preparata: kod nas u paprici Avaunt 3 dana, Lannate 14 dana, piretroidi uglavnom 7 dana (Match u Mađarskoj 7 dana). U kukuruзу šećercu Avaunt 3 dana u Mađarskoj. Za semenski kukuruz radna karenca za Avaunt je kada se preparat osuši na biljci do 1 dan, za druge preparate je obično dva do četiri dana.</p>
<i>Spodoptera exigua</i>	Nema uhvaćenih primeraka	Moguć ulov pojedinačnih leptira.
<i>Ostrinia nubilalis</i>	Broj ženki na klopama je bio mali.	Očekuje se hvatanje pojedinačnih leptira, a moguć je ulov i većeg broja primeraka.
<i>Loxostege sticticalis</i>	28. juna registrovan početak leta leptira. Hvatili su se pojedinačni leptiri.	Očekuje se povećanje brojnosti leptira.
<i>Hyphantria cunea</i>	Nema ulovljenih leptira.	Očekuje se početak leta druge generacije.