

AGROPROTEKT d.o.o.

Nikole Pašića 9, 25000 Sombor

vajgandd@sbb.rs

tel: 063-326772

fax: 025-444905

Rod i vrsta	Trenutno stanje 19. do 27. avgusta	Upozorenje za period od 27. avgusta do 07. septembra
<i>Agrotis segetum</i>	U Čelarevu vrsta je hvatana u većem broju. U Somboru se hvataju pojedinačni primerci.	U južnoj i srednjoj Bačkoj te južnom i srednjem Banatu ukoliko se krompir neće vaditi u skorom periodu, a podgrizajuće sovice su bile ranijih godina brojne, obaviti zaštitu krompira u periodu od 01. do 05 septembra piretroidima (Fastak, Decis). Prskanje obaviti u večernjim ili ranim jutarnjim časovima. Karenca 7 do 14 dana. Na severu Bačke i Banata i u Sremu se nema potrebe za dodatnim suzbijanjem.
<i>Agrotis exclamationis</i>	U Čelarevu vrsta je hvatana u većem broju. U Somboru se hvataju pojedinačni primerci.	Isto kao i kod <i>Agrotis segetum</i>
<i>Agrotis ipsilon</i>	Hvataju se pojedinačni primerci.	Pojava pojedinačnih leptira.
<i>Lacanobia oleracea</i>	Hvatani su pojedinačni primeci.	Očekuje se blagi pad ili stagnacija brojnosti leptira. Obratiti pažnju na ovu vrstu i tokom ovog perioda. U Somboru se ponovo mogu naći sveža jajna legla na karfiolu, kupusu i kelju pupčaru.
<i>Mamestra brassicae</i>	Hvatali su se pojedinačni primerci.	Očekuje se stagnacija ili pad brojnosti. Treba nastaviti sa pregledima kupusnjača na prisustvo jaja i gusenica.
<i>Autographa gamma</i>	Hvataju se pojedinačni primerci.	Očekuje se stagnacija brojnosti leptira.
<i>Helicoverpa armigera</i>	Na početku ovog perioda je brojnost opala, a zatim je u poslednjih nekoliko dana ponovo bila visoka.	Očekuje se stagnacija ili porast brojnosti leptira. Masovno polaganje jaja se posle nekoliko dana stagnacije nastavilo. Na svim pregledanim usevima u okolini Sombora paradajza, paprike (industrijske i babure), kukuruzu (običnom, a posebno šećercu), duvanu, soji i boraniji registrovano je ponovno polaganje jaja. Zaštitu svih useva koji su navedeni treba ponoviti, zavisno od preparata koji je korišten u roku od 5 do 12 dana od predhodnog tretmana. Voditi računa o karenici preparata: kod nas u paprici Avaunt 3 dana, Lannate 14 dana, piretroidi i Actellic uglavnom 7 dana. U kukuruzu šećercu Avaunt 3 dana u Mađarskoj. U soji koristiti bilo koji od navedenih preparata, jer nema registrovan ni jedan insekticid.

<i>Spodoptera exigua</i>	Nema uhvaćenih primeraka	Moguć ulov pojedinačnih leptira.
<i>Ostrinia nubilalis</i>	Na klopci u Čelarevu je u periodu 21 do 24. avgusta registrovano veliko povećanje brojnosti ženki na klopci! Brojnost ženki na klopci u Somboru je jako mala.	U južnoj i srednjoj Bačkoj, te južnom i srednjem Banatu obaviti pregled kukuruza i paprike na prisustvo jajnih legala. Moguće da će u tom delu na nekim usevima biti potreban još jedan tretman i protiv ove štetočine. Optimalni rok za primenu Rimona je odmah, i u naredna tri dana! Optimalni rok za primenu Avaunta je u periodu 30. avgusta do 03. septembra. Optimalni rok za primenu Lannate, piretroida i pirimifosmetila je od 04. do 07. septembra. Na severu Bačke nije potrebno vršiti tretmane. Preporučuje se obavljanje pregleda useva na prisustvo jajnih legala. Obzirom da se vrsta javlja na kukuruzu, na kome je potrebno tretiranje zbog vrste <i>Helicoverpa armigera</i> , hemijsko suzbijanje će pokriti obe štetočine.
<i>Loxostege sticticalis</i>	Registrovan samo jedan leptir.	Moguć ulov pojedinačnih leptira.
<i>Hyphantria cunea</i>	Nije bilo registrovanih leptira.	Moguć ulov pojedinačnih leptira.