

Kandidat:
Dragana Vajgand
Smer: Zaštita bilja
Poljoprivredni fakultet
Novi Sad

Mentor:
Dr Dušan Petrić
Naučna oblast:
Entomologija

PRILOG POZNAVANJU FAUNE LEPTIRA OKOLINE SOMBORA
BOMBYCES I SPHIAGES

NOVE VRSTE U FAUNI LEPIDOPTERA SRBIJE

Tokom desetogodišnjeg istraživanja faune noćnih leptira okoline Sombora je prikupljeno preko 2600 primeraka. Primerci su sakupljeni i preparirani standardnom metodom. Determinacija je obavljena pomoću ključa Forster W. Wohlfahrt Th (1987-1984). Determinaciju pojedinih vrsta su proverili prof.dr K. Vasić i M. Zečević.

Za 11 vrsta nisu nađeni podaci u literaturi da su do sada nađeni na području Republike Srbije. To su:

Meganola albula (Denis-Schifferrmüller, 1776) - Leptiri su sakupljeni kod Lugova u zadnjoj dekadi jula i prvoj polovini avgusta.

Eilema griseola (Hübner, 1803) - kod Lugova su sakupljena samo tri primerka i to dva primerka 23.VII 1986 i jedan primerak 16.VIII 1988.

Rhyarioides metelkanus (Lederer, 1861) - jedan primerak dobijen iz gusenice nađene kod ušća reke Plazović u kanal Bezdán - Vrbas.

Thumata senex (Hübner, 1808) - leptiri su zabeleženi kod Lugova, pojedinih dana i po više primeraka u julu i avgustu.

Gluphisia crenata (Linnaeus, 1768) - leptiri su sakupljeni kod Lugova 1987. godine u drugoj polovini jula i jedan primerak 19. avgusta.

Eutrix potatoria (Linnaeus, 1768) - je zabeležena sa više primeraka leptira u drugoj polovini jula u Somboru i Lugovu; I jedna gusenica u maju kod Bačkog Monoštora.

Meliana stenoptera (Staudinger, 1871) - pojedinačni leptiri su hvatani kod Lugova u drugoj polovini jula i početkom avgusta.

Scopula flaccidaria (Zeller, 1862) - skoro svake godine se zabeleži po više primeraka u julu i avgustu na celom istraživanom području.

Philerme vetulata (Denis - Schifferrmüller, 1776) - samo jedan leptir je uhvaćen u Somboru, 16.VI 1994.

Navedeni podaci ukazuju da je područje Sombora sa okolinom veoma interesantan faunistički objekat, koga treba i u buduće ispitivati.